



STARTER CON ACIDI UMICI E FULVICI

Dema Balance Plus

**NPK 5-7-16 + 3%MgO + 1,5%Fe + 0,1%B
+23%SO₃ + Acidi Umici e Fulvici**

Caratteristiche

Si tratta di **fertilizzanti starter microgranulari con aggiunta di acidi umici e fulvici**, elementi che agiscono come agenti chelanti naturali che si legano ai nutrienti nel terreno. Le radici della pianta assimilano questi **composti acido-nutrienti umici aumentando efficacemente l'assorbimento delle sostanze nutritive** e diminuendo le perdite di nutrienti causate dalla lisciviazione. In combinazione con la fertilizzazione, questi prodotti **consentono di ridurre la quantità di**

nutrienti applicati e di migliorare la qualità e consistenza del suolo. Trattengono anche l'acqua e risultano particolarmente sostenibili, abbattendo i reticoli di argilla e **riducendo il sodio accumulato nel terreno**. Non solo: gli acidi umici e fulvici nel nostro prodotto **funzionano in modo simile all'ormone della crescita delle piante AUXINA**, che promuove crescita e sviluppo delle radici, migliorando l'attività microbica e favorendo il mantenimento di suoli sani.

Composizione chimica

ELEMENTO	%
Azoto (N) totale	5,0
Di cui:	
- Ammoniacale	4,0
- Metileneureico	1,0
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	7,0
Di cui:	
- Solubile in citrato ammonico neutro e acqua	7,0
- Solubile in acqua	6,0
Ossido di Potassio (K ₂ O) totale	16,0
Ossido di Magnesio (MgO) totale	3
Ferro (Fe) totale	2

Aspetto fisico:

Microgranuli

Distribuzione granulometrica:

0,5 - 1,2 mm

Claims

- **NPK BILANCIATO PER LA CRESCITA DELLE COLTURE**
- **EFFETTO BIOSTIMOLANTE DA ACIDI UMICI E FULVICI**
- **CON AZOTO A LENTA CESSIONE**



Indicazioni d'uso

COLTURA

DOSE

MODALITÀ DI UTILIZZO

 Mais, soia, riso, girasole, sorgo	20-40 kg/ha	Localizzato nel solco di semina
 Frumento, cereali autunno vernini, colza	30-60 kg/ha	Localizzato nel solco di semina
 Barbabietola da zucchero	20-40 kg/ha	Localizzato nel solco di semina
 Pomodoro, orticole di pieno campo (seminati)	30-60 kg/ha	Localizzato nel solco di semina, non a contatto delle radici
 Pomodoro, orticole di pieno campo (trapiantati)	20-40 kg/ha	Localizzato nel solco di semina, non a contatto delle radici
 Orticole in serra	40-80 kg/ha	Localizzato ma non sulle radici (trapianto)
 Olivo, fruttiferi	20-50 g/pianta 350 g/m ³	Localizzato
 Vite	5-15 g/pianta	Localizzato

Avvertenze

Le dosi possono variare a seconda della fertilità del suolo, della produttività della coltura, delle condizioni d'uso.

Packaging

- 20 kg BAG | pallet 1000 kg
- 300 kg BIG BAG | pallet 900 kg
- 500 kg BIG BAG | pallet 1000 kg

